

Centre Hospitalier
Sainte-Marie
LE PUY-EN-VELAY

Rôle de l'IPA PSM
dans l'accompagnement et la
prévention de la rupture
du parcours de soins des
personnes âgées souffrant
de troubles dépressifs

15èmes CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE du 29 novembre au 2 décembre 2023, LYON

Nicolas GALLIEN - IPA PSM Dr Ghislaine MERY-POURHADI - Médecin-cheffe de pôle Valérie MARCON - Cadre supérieure de santé

CONTEXT

Dans notre pays, 30% de la population a plus de 60 ans (INSEE, 2018). La dépression du sujet âgé est un enjeu majeur en terme de santé publique. En effet, elle représente, selon le lieu de vie du patient entre 15 et 40 % des pathologies psychiatriques dans cette tranche de population. La complication la plus redoutée de la dépression chez la personne âgée reste à ce jour le risque suicidaire. Sur notre territoire rural, nous faisons face à un manque de praticiens spécialisés. La stigmatisation peut également représenter un frein à la prise en charge en milieu psychiatrique. Les aidants sont souvent démunis face à la pathologie de leur proche, envahissante et prégnante au quotidien.



OBJECTIF

EXPLORER L'ORGANISATION DU PARCOURS
DE SOINS EN PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE
ÂGÉE ET EN IDENTIFIER
LES OBSTACLES, LES
FREINS ET LES LEVIERS.



RÉSULTAT

- Manque de coordination entre les intervenants
- ·Epuisement des aidants
- ·Approche globale du patient nécessaire
- ·Réduire les délais de consultation
- Lutter contre la stigmatisation
- Développer la téléconsultation
- ·Les compétences de l'IPA ciblent la santé du patient et de son entourage, de manière globale

(O) MÉTHODE


Notre question de départ était :

« Quels sont les facteurs favorisant et limitant l'accès aux soins chez les personnes âgées de plus de 65 ans souffrant de dépression? »

Nous avons mené une revue de littérature ayant conduit à l'inclusion de 17 articles et thèses.



SCAN ME



CONCLUSION

L'IPA propose une nouvelle offre qualitative dans le parcours de soin du patient en psychiatrie de la personne âgée. Il ne vient pas se substituer au manque de médecins, mais plutôt en support de celui-ci, afin de limiter la perte de chance pour le patient.